



Phone: (210) 679-4747 Fax: (210) 679-4748

Dr. Jennifer M. Ochoa DDS ~ Dr. Christina R. Gonzales DDS

ANESTESIA GENERAL EN UNA FACILIDAD

La anestesia general se recomienda para nuestros pacientes que tengan un alto nivel de la ansiedad, niños muy jóvenes, niños con necesidades especiales, y de los pacientes que no podrían terminar el tratamiento bajo sedación consciente. La anestesia general totalmente duerme a su niño. Éste sería igual como si se le pone tubos en los oídos. Esto se preforma solamente en un ajuste del paciente no internado.

ANTES DE LA CITA:

- **Nada comer o beber después de medianoche el día antes de su cita.** Es muy importante que esto sea seguido. Si no se sigue, no tratarán a su niño y la cita tendrá que ser cancelada.
- Un padre o un guarda legal debe acompañar al niño a la cita del hospital y permanecer en la sala de espera quirúrgica del sitio durante el tratamiento.
- Vista a su niño en la ropa suelta y/o cómoda.
- Traiga una bolsa para las pertenencias de su niño porque un vestido del hospital será usado durante el procedimiento.
- Si su niño toma regularmente una medicación por la mañana, es el mejor sostenerse a tomar se las, al menos que la doctora le haiga dado instrucciones de otra manera.
- A nuestro anestesiólogo evalúa a cada paciente el día de cirugía.

DESPUÉS DE LA CITA:

- Su niño será probablemente soñoliento o un poco mareado. No se sorprenda si su niño quiere tomar una siesta por varias horas, nomas asegure se que su niño este acostado en su lado y es supervisado de cerca por un adulto para el resto del día.
- Las actividades se deben limitar a ver la TV, y jugar a dentro de su casa.
- Su niño no debe volver a la escuela o a la guardería hoy. Necesita estar bajo supervisión cercana.
- No planee ni permita las actividades para su niño después del tratamiento. Las actividades de su niño deben ser limitadas y supervisadas hoy. Esto no significa montar a caballo corriente, bicicleta, el patinaje de rodillo o nadar en la piscina.
- Su niño puede experimentar cierta náusea. Permita por favor solamente los líquidos claros (Gatorade y Pedialite) seguidos por alimentos más suaves. No dé por favor los alimentos pesados (las hamburguesas o pizza) al comienzo con.
- Tan pronto como usted consiga el hogar, usted puede dar a su niño Motrin o Tylenol para el dolor. Una medicación más fuerte de la prescripción para el dolor le será dada por el Dr. Ochoa/el Dr. Gonzales el día de cirugía.
- La boca, los labios y la lengüeta de su niño pueden ser entumecidos. Este entumecimiento dura por hasta 2 horas, satisface tan supervisa eso.

Por favor adviértase que un aviso de 72 horas se requiere para la cancelación de esta cita!